

2018-046

mercoledì, 21 Novembre 2018

Da analisi con **RAMAN Spectroscopy** il campione risulta:

COCAINE HCL

Da analisi con GC-MS il campione risulta contenere:

40% COCAINA

Il campione contiene cocaina. Leggi attentamente quanto scritto sotto (effetti, effetti avversi, dosaggio, rischi, safer use).

Il fatto che da analisi con **RAMAN Spectrometry** sia risultata la sigla “hcl” significa che la sostanza ha subito un processo di salinificazione, eseguito al fine di rendere più “sniffabile” la polvere. Cosa molto comune nella cocaina.

Il campione non contiene tagli che possano avere un effetto psicoattivo e/o particolarmente dannoso (come per esempio il levamisolo). Questo tuttavia non significa che il restante 60% non contenga nulla: è possibile si tratti di zuccheri o sali che non vengono sciolti dalla soluzione che serve per preparare il campione per le analisi quantitative.

SAFER USE

Se è la prima volta che si assume cocaina prendere la metà della dose rispetto a chi è abituato a farlo; non esistono antidoti ed un sovradosaggio può essere mortale

Non usare cocaina se si soffre di epilessia, ipertensione, asma o turbe psichiche

Evitare di consumare frequentemente cocaina, il rischio di dipendenza è molto elevato! fare delle pause durante le quali non si consuma, soprattutto se si ha l'impressione che sia difficile smettere

Ricordarsi di bere bibite analcoliche (l'alcol disidratata, non idrata!!!), di fare di tanto in tanto delle pause all'aria fresca e riposarsi dalle danze. Cocaina e alcool causano maggiore aggressività.

Se si sniffa non utilizzare banconote e/o pippotti in comune (rischio epatiti e altre malattie/infezioni)... meglio un pezzo di carta pulito!!! Usare un “pippotto per una riga” e sciacquare le narici prima e dopo

Se si inietta usare materiale sterile e disinfettare la cute prima e dopo

Evitare di assumere cocaina a stomaco pieno (nausea) ma non assumerla a stomaco vuoto

tte Sicura: Chill OUT!!! - Neuttravel

2018_046

Se è la prima volta che si prova una sostanza, prendere informazioni su di essa prima di assumerla

COCAINA

La cocaina è un estratto delle foglie di coca, pianta coltivata in America del Sud. Si presenta generalmente sotto forma di polvere bianca o cristalli (crack); può essere sniffata, fumata (crack o free base), iniettata.

Effetti: la cocaina agisce sul sistema nervoso centrale aumentando la concentrazione di dopamina nel cervello; la dopamina è un neurotrasmettitore che è in grado di provocare sensazioni di piacere, come quelle che si provano mangiando, bevendo, facendo sesso ecc. Per questo motivo la cocaina fa sentire euforici, allegri, con molta voglia di parlare, si percepiscono in maniera attenuata fame e dolore; ci si percepisce inoltre come lucidi, si ha la sensazione di possedere maggior precisione nel movimento fino ad arrivare a ideazioni di onnipotenza.

La cocaina comincia a fare effetto dopo 2-3 minuti e può durare fino a 1-2 ore; nel caso in cui venga fumata gli effetti durano di meno ma sono più intensi.

La discesa è caratterizzata da sonnolenza, lieve depressione, rallentamento dei riflessi, ci si sente stanchi e privi di energie. Aumenta il desiderio di riprovare gli effetti piacevoli assumendo un'altra dose di sostanza.

Effetti avversi/collaterali: durante la salita della sostanza è possibile provare angoscia, che però passa presto. La cocaina può provocare tremori, cefalea, ansia, sudorazione aumentata, brividi, nausea, agitazione psicomotoria (non si riesce a stare fermi).

Altri effetti collaterali indesiderati possono essere: disturbi psichici come instabilità emotiva, insonnia, irritabilità, scatti di violenza, paure infondate (paranoia); modificazioni del comportamento relativo alla mobilità come iperattività, contrazioni nervose e movimenti stereotipati; alterazioni organiche come convulsioni, tremore, danni al fegato, aritmie cardiache e in casi gravi infarto cardiaco o ictus cerebrale. Con il tempo la cocaina provoca un'incapacità cronica di provare piacere. La cocaina può causare disfunzioni nei rapporti sessuali (erectili, di eiaculazione ecc.): si è più stimolati al rapporto sessuale ma si ha meno sensibilità e si fa difficoltà ad eiaculare; nei casi più gravi e con grosse assunzioni di cocaina può insorgere impotenza.

La cocaina può portare a dipendenza ed a comportamento compulsivo: anche a distanza di anni, la vista di cose o oggetti che ricordano la cocaina può far scattare un impulso irrefrenabile di assumerne di nuovo.

Rischi: la cocaina provoca ipertensione e può portare ad infarto cardiaco o ictus celebrale; sono particolarmente a rischio i soggetti con problemi di cuore. Se viene iniettata aumenta il rischio di setticemie, endocarditi, epatiti e HIV: vanno usate siringhe sterili, acqua distillata e va disinfettata la cute prima e dopo l'iniezione. Chi soffre di asma rischia una crisi, fumando la sostanza.

Aumenta il rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili a causa della disinibizione provocata dalla sostanza: ricordare di usare sempre il preservativo e i consigli del [safe sex!](#)

Un uso prolungato di cocaina può causare dipendenza e portare a crisi di astinenza con sintomi che si prolungano per ventiquattr'ore. La cocaina può causare alterazioni organiche come convulsioni, danni al fegato, aritmie cardiache e in casi gravi infarto cardiaco o ictus cerebrale. Nei consumatori abituali possono verificarsi ripetute microlesioni nel cervello con rischio di demenza.

Le interazioni con i farmaci possono causare un aumento repentino della pressione del sangue con rischio di ipertensione arteriosa e possibile esito letale.

La cocaina può causare overdose ed è necessario intervenire in massimo un'ora.

La cocaina può essere mischiata con sostanze da taglio i cui effetti e rischi sono difficilmente valutabili.

Fonti delle informazioni:

danno.ch; Wikipedia; ASL TO4; InSostanza.it

tte Sicura: Chill OUT!!! - Neuttravel

2018_046