

2018-047

martedì, 20 Novembre 2018

Da analisi con **RAMAN Spectroscopy** il campione risulta:

INCONCLUSIVE

Da analisi con GC-MS il campione risulta contenere:

43% AMFETAMINA

La sostanza rilevata nel campione risulta essere amfetamina, con una percentuale di purezza elevata rispetto alla media. L'elevata purezza non necessariamente fa aumentare solo gli effetti positivi: può invece far aumentare quelli negativi (come la paranoia).

Una percentuale di purezza elevata della sostanza incrementa sicuramente i rischi, che possono essere: tremolio, agitazione, nausea, accelerazione del ritmo cardiaco e tachicardia, insonnia, mal di testa, nervosismo, irritabilità, perdita dell'appetito, comportamenti aggressivi (soprattutto se in combinazione con l'alcol).

SI consiglia di non associare l'anfetamina agli psichedelici. Prestare attenzione al mix con alcool: gli effetti dell'anfetamina hanno una durata minore di quelli dell'alcool (quando scende l'anfetamina si percepisce quanto si è ubriachi)

L'anfetamina viene spesso adulterata (tagliata) con la caffeina. Il mix delle due sostanze provoca un forte aumento di due mediatori chimici cerebrali, la dopamina e la noradrenalina, questa combinazione è neurotossica (danni al cervello) provoca una intensa disidratazione, aumento della temperatura e mette sotto pressione il sistema cardiovascolare (tachicardia, disidratazione, agitazione, diminuzione dell'appetito, nervosismo, insonnia ecc.)

SAFER USE

Se non c'è la possibilità di analizzare la pillola, prendere ½ pasticca, aspettare 2 ore e valutare gli effetti.

Riflettere attentamente se è davvero necessario assumere successive dosi.

Ricordarsi di bere bibite analcoliche (l'alcol disidrata, non idrata!!!), di fare di tanto in tanto delle pause all'aria fresca e riposarsi dalle danze

Se si sniffa non utilizzare banconote e/o pippotti in comune (rischio epatiti e altre malattie/infezioni)... meglio un pezzo di carta pulito!!! Usare un "pippotto per una riga" e sciacquare le narici prima e dopo di sniffare

Se è la prima volta che si prova una sostanza, prendere informazioni su di essa prima di assumerla

ANFETAMINA

Comunemente conosciuta come “Speed”, l’anfetamina può presentarsi sotto forma di polvere o pasta di colore bianco, giallo o rosa; più raramente presenta sotto forma di compresse (pasticche).

Effetti: L’anfetamina incrementa la produzione di noradrenalina, uno stimolante prodotto dall’organismo, e di dopamina; la sostanza provoca un aumento della temperatura corporea, riduce la percezione della fame e della fatica e diminuisce la soglia del dolore. Assumendo anfetamina ci si sente euforici, aumenta la voglia di parlare ma aumenta anche la propensione a prendere dei rischi.

L’anfetamina fa effetto da 2 a 10 minuti dopo l’assunzione se sniffata, mentre se ingerita può impiegare da 30 a 45 minuti. La durata degli effetti varia da 2 a 4 ore.

Il down della sostanza può provocare un forte bisogno di dormire, fame, stati depressivi, irritabilità ecc..

Va considerato che gli effetti dell’anfetamina dipendono sempre da : fattori e caratteristiche personali, quali le condizioni fisiche e psichiche, che possono variare da persona a persona, la quantità assunta, i mix con farmaci, altre droghe e/o alcool ed infine dipendono dalla tolleranza che la persona sviluppa alla sostanza (assunzioni frequenti aumentano la tolleranza)

Effetti avversi possono essere: tremolio, agitazione, nausea, accelerazione del ritmo cardiaco e tachicardia, insonnia, mal di testa, nervosismo, irritabilità, perdita dell’appetito, comportamenti aggressivi (soprattutto se in combinazione con l’alcool). Ad alti dosaggi l’anfetamina può causare allucinazioni, arresto circolatorio, attacchi cerebrali, arresto cardiaco, epatico, dei reni e perdita di coscienza con possibile coma. Un effetto avverso dell’anfetamina può essere l’innalzamento della temperatura corporea (fino a 41 gradi) che può causare ipertermia maligna e disidratazione e condurre al decesso. L’uso abituale può causare carenze di calcio, con conseguenti problemi ossei e dentali, depressione, uno stato di agitazione permanente (ma anche stanchezza), insonnia, problemi circolatori, ansia e paranoia, fino alla psicosi. Tra gli altri disturbi si citano ipertensione, perdita di peso, infiammazioni della pelle, mal di stomaco, problemi al fegato e ai reni e crampi diffusi. Sniffare provoca inoltre danni alle mucose nasali, buccali e l’ingestione danneggia le mucose dello stomaco.

Rischi a lungo termine: l’anfetamina può creare forte dipendenza. Il consumo abituale di speed porta spesso a carenze di calcio, con il conseguente insorgere di problemi ossei e dentali e problemi psichici quali la depressione. Un consumo intenso può causare uno stato di agitazione permanente, insonnia, problemi circolatori, ansia e paranoia, fino alla psicosi. Tra gli altri disturbi si citano ipertensione, perdita di peso, infiammazioni della pelle, mal di stomaco, problemi al fegato e ai reni e crampi diffusi. Il consumo cronico di speed favorisce l’insorgere di emorragie e attacchi cerebrali con possibili paralisi.

Fonti delle informazioni:

danno.ch; Infoshock; ASL TO4, Tripsit.me

tte Sicura: Chill OUT!!! - Neuttravel

2018_047