


CAMPIONE	Analisi sul campo		Analisi di laboratorio
2021_001			
	Raman Spectroscopy	Colorimetrico EHRlich	GC-MS*
Risultato	INCONCLUSIVE	NESSUNA REAZIONE	1cP-LSD

*gascromatografia-spettrometria di massa



Questo blotter contiene 1cP-LSD. Non è possibile quantificare la percentuale di NPS presenti in quanto non esistono al momento degli standard di riferimento.

La dietilamide dell'acido 1-ciclopropionil-d-lisergico (nota come 1cP-LSD) è una nuova sostanza psichedelica semisintetica della classe delle lisergamide. 1cP-LSD è un analogo dell'LSD e un omologo dell'1P-LSD di cui produce effetti simili. 1cP-LSD è apparso sul mercato chimico della ricerca online come una nuova alternativa all'LSD quando l'1P-LSD è stato proibito in Germania.

La sua farmacologia non è del tutto conosciuta. Alcuni studi indicano che potrebbe agire come profarmaco per l'LSD. Gli effetti caratteristici includono allucinazioni visive geometriche, distorsione del tempo, maggiore introspezione e dissoluzione dell'ego.

Le sostanze presenti nel campione analizzato sono definite NPS, cioè Nuove Sostanze Psicoattive. Le NPS sono composti che mimano gli effetti delle c.d. sostanze tradizionali e che vengono immessi sul mercato per eludere i controlli. Essendo sostanze "nuove" non vi sono studi clinici su rischi e danni che si possono avere dall'assunzione di queste droghe ed inoltre si hanno scarse informazioni circa i mix di NPS (sono presenti solo racconti di chi ha già sperimentato la sostanza e/o eventuali mix).

Per il fatto che la conoscenza di rischi e danni su queste sostanze è molto limitata, esse si rivelano allo stato attuale **POTENZIALMENTE PERICOLOSE E DANNOSE**.

Adottare sempre strategie di riduzione del danno in caso di assunzione di NPS.

SAFER USE



- Se non c'è la possibilità di analizzare la sostanza, prenderne ¼ di blotter (cartone), aspettare 2 ore e valutare gli effetti.
- Riflettere attentamente se è davvero necessario assumere successive dosi.
- Assumere la sostanza soltanto in contesti e con persone con cui ci si sente sicuri ed in sintonia.
- Non prendere degli allucinogeni se hai disturbi fisici o psichici.
- Non mischiare con altre sostanze, alcol o farmaci.
- Ricordarsi di bere bibite analcoliche (l'alcol disidrata, non idrata).
- Evita le strade o altri luoghi pericolosi. Gli allucinogeni possono provocare disorientamento.
- Bere acqua e succhi di frutta aiuta a calmarsi.
- In caso di bad trip o horror trip chiedi aiuto ad esperti.

Notte Scura - Chill OUT!!! - Neutravel

2021_001

- I viaggi psichedelici devono rimanere esperienze straordinarie e non vanno ripetuti più di una volta al mese. Farne un uso troppo frequente attenua gli effetti e aumenta i rischi.
- Se è la prima volta che si prova una sostanza, prendere informazioni su di essa prima di assumerla



1cP-LSD

1cP-LSD è un composto semisintetico della famiglia delle lisergamide simile all'LSD. Sulla base della sua somiglianza strutturale con l'LSD, 1cP-LSD probabilmente agisce come un agonista parziale del recettore 5-HT_{2A}. Si pensa che gli effetti psichedelici derivino principalmente dalla sua efficacia sui recettori 5-HT_{2A} distribuiti in tutto il cervello. È probabile che l'1cP-LSD mostri anche un'attività di legame a un'ampia gamma di recettori delle monoamine, come quelli per la dopamina e la noradrenalina. Tuttavia, attualmente non ci sono dati a supporto di queste affermazioni.



Effetti: dilatazione pupillare e principalmente effetti simili a quelli dell'LSD, uniti a effetti stimolanti e di euforia. Un aumento delle capacità cognitive e di analisi e introspezione, aumento della creatività.

Effetti collaterali: soppressione dell'appetito, difficoltà a urinare, sbadiglio eccessivo: questo effetto è significativamente meno pronunciato rispetto alla psilocibina e ai suoi composti correlati, le triptamine sostituite in quattro posizioni. Nausea, Aumento della pressione sanguigna, aumento della frequenza cardiaca, maggiore sudorazione, contrazioni muscolari, spasmi muscolari, aumento della salivazione, vasocostrizione che può indurre a sentire freddo, specialmente alle estremità.



Rischi a breve e lungo termine: i rischi legati al consumo di analoghi dell'LSD sono anche di ordine psichico e dipendono molto dalla personalità; le persone che macerano problemi irrisolti, quelle che hanno un io debole, delle fragilità oppure hanno sofferto di disturbi psichici, rischiano di incorrere in bad trip e dover ricorrere a terapie psichiatriche anche dopo una sola assunzione. La brutta esperienza data dal bad trip è causa dello "scompenso".

Inoltre, i cambiamenti di percezione durante un trip possono essere così intensi da diventare incontrollabili e provocare molta paura. Assunzioni frequenti possono portare ad ansia, paranoia, difficoltà a dormire e problemi di natura psichica.

Essendo una sostanza scarsamente conosciuta nell'ambito dell'uso ricreativo da parte dell'uomo, non vi sono dati scientifici che possano indicare con certezza rischi e danni di lungo termine del 1cP-LSD

Durante un viaggio psichedelico si può provare un forte desiderio sessuale ed aumenta la disponibilità per pratiche sessuali a rischio: attuare sempre i consigli del **safe sex**.

Fonti delle informazioni: PsychonautWiki, Erowid, KnowDrugs

Notte Sicura: Chill OUT!!! - Neuttravel

2021_001