

CAMPIONE 2022_016	Analisi sul campo	Analisi di laboratorio
	Raman Spectroscopy	GC-MS*
Risultato	INCONCLUSIVE	DPT

*gascromatografia-spettrometria di massa

Il DPT (N,N-dipropiltriptamina) è una triptamina psichedelica sintetica, simile alla DMT per intensità degli effetti, ma con una durata maggiore e molto più imprevedibile rispetto alle altre triptamine. La DPT viene normalmente assunta oralmente, fumata o per inalazione.

In caso di consumo regolare può portare a elevata assuefazione. I dosaggi possono aumentare in modo significativo, sebbene non induca tolleranza.

SAFER USE



- Consuma in un contesto in cui ti senti a tuo agio e con delle persone che hanno già fatto esperienza di DPT.
- I viaggi psichedelici devono rimanere esperienze straordinarie e non vanno ripetuti più di una volta al mese. Farne un uso troppo frequente attenua gli effetti e aumenta i rischi.
- Rinunciare al consumo se si ha paura dei potenti effetti psichedelici. La paura può scatenare esperienze negative. Non assumere DPT da soli! Sedersi in locale protetto (non durante i party) in compagnia di persone esperte di cui potersi fidare. La prima volta, assumere una dose bassa e non prenderne un'altra! Rinunciare a miscele avventate e sconsiderate. L'assunzione contemporanea di DPT e alcol ne modifica gli effetti e può avere effetti collaterali spiacevoli. Le persone che soffrono di pressione alta, dovrebbero rinunciare al consumo di DPT. Anche se l'ebbrezza è breve, gli effetti secondari possono durare diverse ore (capacità di guida compromessa, ecc.)
- Fai delle pause fra un consumo e l'altro. Dopo l'assunzione, è importante concedersi tempo e tranquillità per smaltire il trip.

DPT



Effetti: Aumento della pressione sanguigna e del battito cardiaco, dilatazione delle pupille. Breve euforia, percezione del tempo fortemente alterata (rallentamento). L'immersione in universi bizzarri, la separazione di corpo e mente, la dissoluzione dell'io e una sensazione di unione con il mondo sono la regola; esperienze di stati di pre-morte sono pure frequenti. Sembra che le triptamine svolgano un ruolo fondamentale nelle esperienze oniriche e in stati di coscienza inconsueti. Le esperienze di DPT vengono descritte come "bizzarre", "inquietanti" e "più dark" rispetto alle esperienze di DMT; la DPT viene descritta come più fisica e sensuale delle altre triptamine.

Notte Sicura: Chill OUT!!! - Neuttravel

2022_016

Inizio degli effetti: dai 20 ai 60 minuti.

Durata degli effetti: dalle 2 alle 4 ore.

Effetti secondari: In caso di assunzione orale, gli effetti secondari possono durare fino a 8 ore! Attenzione ai mix con LSD, psilocibina, canapa, 2C-x: mischiare diversi psichedelici può risultare pericoloso e controproducente per il viaggio stesso.

Effetti collaterali: la DPT provoca spesso nausea e vomito. Altri effetti collaterali sono: aumento della frequenza cardiaca, leggero acceleramento della respirazione, aumento della pressione sanguigna, dilatazione delle pupille, aumento della salivazione, tremore, agitazione e mal di testa, come pure disturbi motori, sensazioni di leggerezza e fino all'impressione di cadere. Il forte cambiamento di percezione e la dissoluzione dell'identità personale possono essere vissuti in modo traumatico anche dai consumatori più navigati («bad trip»).

Bad trip/horror trip: è una brutta esperienza che si può verificare nel momento di “salita” del trip fino anche ad alcune ore dopo i primi effetti. Sale la paranoia e si comincia a sentirsi agitati, angosciati ed incapaci di gestire le proprie azioni; si può vivere un vero e proprio incubo, con crisi di panico e psicosi.

A volte un bad trip può diventare un vero e proprio trauma che può scatenare fobie, stati confusionali e angosce durature. Alcuni sostengono che i bad trip ritornino in flashback, cioè momenti in cui si sentono gli effetti della sostanza senza averlo assunto; queste teorie sono state smentite: nonostante generi ricordi traumatici e difficili da integrare, il bad trip ha natura momentanea perché deriva da una sensazione negativa interiore (legata al “set”), causata da eventi esterni (legata al “setting”), o causata da pensieri o la comprensione di realtà che possono risultare sgradevoli (non è raro durante un trip di realizzare aspetti della propria vita che possono non piacere) che viene amplificata dallo psichedelico, rendendola difficile da gestire. In tali casi gli operatori sociali consigliano il dialogo; in casi molto intensi la somministrazione di torazina o benzodiazepine può attenuare le sensazioni negative.

Dosaggi: DOSAGGIO DPT: Fumata: 15 – 100 mg; Orale: 75-350 mg; Inalazione: 20-200 mg



Rischi a breve e lungo termine: Possibili disturbi permanenti della percezione di sé e della realtà. Eventuali psicosi latenti possono manifestarsi. Assunzioni frequenti possono portare a ansia, paranoia, difficoltà a dormire e problemi di natura psichica.

Durante un viaggio psichedelico si può provare un forte desiderio sessuale ed aumenta la disponibilità per pratiche sessuali a rischio: attuare sempre i consigli del **safe sex**.

Fonti delle informazioni: Erowid, Danno.ch, ASL TO4

Notte Sicura: Chill OUT!!! - Neuttravel

2022_016