



Da analisi con **RAMAN Spectroscopy** ed il risultato è:

INCONCLUSIVE

Il campione viene sottoposto ad analisi con **test colorimetrico**:

EHRlich: nessuna reazione

Il campione viene analizzato con **GC-MS** ed il risultato è

25B-NBOMe 1000µg

Nel campione analizzato vi è un **FORTE DOSAGGIO DI 25B-NBOMe !!**

Sopra i 700 µg il trip è molto potente e a dosi superiori i 1000 µg si può andare incontro a rischi molto importanti, come il decesso.

E' stata analizzato soltanto ½ blotter per cui è difficile stabilire la composizione esatta del blotter intero

Negli Stati Uniti ed in Europa sono stati registrati due decessi relativi all'assunzione eccessiva di questa sostanza.

La sostanza presente nel campione analizzato è definita NPS, cioè Nuova Sostanza Psicoattiva. Le NPS sono composti che mimano gli effetti delle c.d. sostanze tradizionali e che vengono immessi sul mercato per eludere i controlli. Essendo sostanze "nuove" non vi sono studi clinici su rischi e danni che si possono avere dall'assunzione di queste droghe ed inoltre si hanno scarse informazioni circa i mix di NPS (sono presenti solo racconti di chi ha già sperimentato la sostanza e/o eventuali mix).



Per il fatto che la conoscenza di rischi e danni su queste sostanze è molto limitata, esse si rivelano allo stato attuale delle cose POTENZIALMENTE PERICOLOSE E DANNOSE.

Adottare sempre strategie di riduzione del danno in caso di assunzione di NPS.

25B-NBOMe

Il **25B-NBOMe**, conosciuto anche come N-BOMB, è una sostanza psichedelica ed allucinogena appartenente al gruppo delle fenetilamine

ed è un derivato della sostanza 2CB

Si presenta generalmente in blotter (cartoni), ma può essere trovato anche in forma di polvere e in gocce. Il 25B-NBOMe si differenzia dall'LSD nel gusto: è infatti molto amaro mentre in genere l'LSD non ha gusto.

Effetti: Il 25B-NBOMe produce effetti simili a quelli delle sostanze allucinogene e psichedeliche; alcuni descrivono anche effetti empatogeni, simili a quelli dell'MDMA ma meno intensi. Le percezioni vengono alterate: aumentano le sensazioni tattili, si è percorsi da leggeri formicolii e sensazioni di addormentamento/insensibilità degli arti e della bocca, ci si percepisce più leggeri e tempo, udito e vista risultano distorti. Il 25B-NBOMe fa vedere i colori più intensi, gli oggetti possono emettere fasci di luce oppure sdoppiarsi, alcuni raccontano di aver visto il paesaggio attorno che pareva "fatto a fette"; altri riferiscono visioni geometriche e di frattali, simili a quelli del DMT, altri ancora dicono di aver visto le cose intorno e di essersi sentiti come in un cartone animato mandato al rallentatore.

Il 25B-NBOMe dà inoltre effetti stimolanti, simili a quelli delle anfetamine: la maggior parte delle persone riferisce di aver provato una forte energia, ma non incontrollabile; alcuni riferiscono invece di energia incontrollata e bruxismo.

Il 25B-Nbome aumenta il desiderio sessuale.

Gli effetti del 25B-NBOMe possono durare dalle 12 alle 16 ore. In genere comincia a salire dopo 30 – 90 minuti ma il picco degli effetti si può ottenere anche dopo 4-6 ore dalla sua assunzione.

Chi ha consumato il 25B-NBOMe riferisce di effetti diversi per ogni assunzione.

Effetti avversi/collaterali: Il 25B-NBOMe provoca nausea nel momento in cui sale e può anche dare vomito, incrementa il battito del cuore (tachicardia), provoca un aumento della pressione, vasocostrizione, bruxismo, senso di stanchezza e perdita di memoria.

Alcuni riferiscono di una soppressione dell'ego e dell'incapacità di prendere qualsiasi decisione.

Il 25B-NBOMe può dare allucinazioni molto potenti e bad trip.

Gli effetti di down possono durare dalle 2 alle 6 ore. In alcuni casi si protraggono anche il giorno successivo l'assunzione.

Dosaggio: Non si hanno dati di letteratura che possono documentare in modo corretto i dosaggi, essendo disponibili solo resoconti di chi ha usato il 25B-NBOMe; è **tuttavia fortemente sconsigliato assumere alti dosaggi della sostanza!**



Già a 50-100 µg il 25B-NBOMe è attivo. Effetti leggeri si hanno dai 100 µg ai 300µg, effetti “comuni” dai 300µg ai 500µg mentre, superata questa soglia, gli effetti possono essere molto potenti. Sopra i 700µg si ottiene un effetto molto pesante e va ricordato che **il 25B-NBOMe può essere fatale a dosi elevate. Si consiglia di non superare mai la soglia dei 1000 µg!!**

Rischi: La tossicità ed i danni a lungo termine provocati dal 25B-NBOMe non sono tuttavia sufficientemente documentati né sono stati sufficientemente studiati, per cui sono al momento incerti

Se sniffato il 25B-NBOMe può essere molto pericoloso, per la alta probabilità di assumerne una dose eccessiva e che potrebbe rivelarsi fatale

Il 25B-NBOMe provoca **tolleranza** immediatamente

Posso verificarsi incidenti in quanto la sostanza causa dispercezione di sé e dell’ambiente circostante.

Il 25B-NBOMe può causare psicosi, paranoia, ansia, disturbo post-traumatico da stress ed altri disturbi di natura psichiatrica.

Durante un viaggio psichedelico si può provare un forte desiderio sessuale ed aumenta la disponibilità per pratiche sessuali a rischio: attuare sempre i consigli del **safe sex**.

Per maggiori info vedi [25B-NBOMe](#)

SAFER USE

Se non c'è la possibilità di analizzare la sostanza, prenderne ¼ di blotter (cartone), aspettare 2 ore e valutare gli effetti.

Riflettere attentamente se è davvero necessario assumere successive dosi.

Assumere la sostanza soltanto in contesti e con persone con cui ci si sente sicuri ed in sintonia.

Non prendere degli allucinogeni se hai disturbi fisici o psichici

Non prendere il 25B-NBOMe se fai uso di neurolettici e/o antistaminici. Le sostanze psichedeliche rischiano di far manifestare i sintomi che cerchi di attenuare con i farmaci

Non mischiare il 25B-NBOMe con altre sostanze, alcol o farmaci

Ricordarsi di bere bibite analcoliche (l'alcol disidrata, non idrata!!!), di fare di tanto in tanto delle pause all'aria fresca e riposarsi dalle danze

Evita le strade o altri luoghi pericolosi. Gli allucinogeni possono provocare disorientamento.

Bere acqua e succhi di frutta aiuta a calmarsi.



In caso di bad trip o horror trip chiedi aiuto ad esperti

I viaggi psichedelici devono rimanere esperienze straordinarie e non vanno ripetuti più di una volta al mese. Farne un uso troppo frequente attenua gli effetti e aumenta i rischi.

Se è la prima volta che si prova una sostanza, prendere informazioni su di essa prima di assumerla

Fonti delle informazioni:

Wikipedia, PsychonautWiki, 4fa.com, , Erowid, Drugs Forum