



Il campione viene sottoposto ad analisi con **test colorimetrico**:

**MANDELIN**: nessuna reazione

**MARQUIS**: nessuna reazione

**GALLIC**: nessuna reazione

Da analisi con **RAMAN Spectroscopy** ed il risultato è:

**INCONCLUSIVE**

Il campione viene analizzato con **GC-MS** ed il risultato è

## **Metronidazolo (Flagyl® 500)**

La pasticca analizzata non risulta essere MDMA, come supposto, ma contiene principio attivo del Flagyl (metronidazolo), un antibiotico utilizzato per il trattamento delle infezioni genitali o del tratto stomaco intestino. Come effetti collaterali il farmaco può causare allucinazioni, vertigini, stordimento, crampi, disturbi temporanei della vista e dell'attenzione. Per questo è sconsigliato guidare nel periodo di trattamento del farmaco. Può essere rischiosa l'assunzione di Flagyl in contemporanea di alcool .

Per maggiori informazioni su Flagyl vedi qui

### **SAFER USE**

Se non c'è la possibilità di analizzare la sostanza, assumerne un piccolo quantitativo e valutarne gli effetti.

Riflettere attentamente se è davvero necessario assumere successive dosi.

Ricordarsi di bere bibite analcoliche (l'alcol disidrata, non idrata!!!), di fare di tanto in tanto delle pause all'aria fresca e riposarsi dalle danze

Se si sniffa non utilizzare banconote e/o pippotti in comune (rischio epatiti e altre malattie/infezioni)... meglio un pezzo di carta pulito!!! Usare un "pippotto per una riga" e sciacquare le narici prima e dopo di sniffare

Se è la prima volta che si prova una sostanza, prendere informazioni su di essa prima di assumerla