



Da analisi con **test colorimetrico**:

MARQUIS: nessuna reazione

MANDELIN: nessuna reazione

Il campione viene sottoposto ad analisi con **RAMAN Spectroscopy** ed il risultato è:

PROCAINE / LIDOCAINE

La sostanza non contiene stupefacenti ma solo agenti adulteranti (tagli): procaina e lidocaina; quest'ultime vengono spesso utilizzate come sostanze da taglio in aggiunta ad alcune droghe illegali, prima fra tutte la cocaina. Quando assunta, la cocaina tende a desensibilizzare le gengive. La lidocaina e la procaina, essendo analgesici locali, provocano un effetto ancor più potente; pertanto, la cocaina viene spesso adulterata con lidocaina e/o procaina proprio per il motivo appena esposto. La lidocaina e la procaina sono farmaci che vengono generalmente usati come anestetici locali, soprattutto in odontoiatria.

La lidocaina può essere usata anche come topico per la pelle, per alleviare bruciore e prurito. Sintomi associati ad assunzione (sovradosaggio) di lidocaina possono essere: eccitazione, tremori, disorientamento, vertigini, midriasi, aumento del metabolismo e della temperatura corporea, per dosi molto elevate, trisma (contrattura dei muscoli della mandibola) e convulsioni, sudorazione, aritmie (battiti irregolari) , ipertensione, tachipnea, broncodilatazione, nausea e vomito.

SAFER USE

Se non c'è la possibilità di analizzare la sostanza, prenderne ½ dose, aspettare 2 ore e valutare gli effetti.

Riflettere attentamente se è davvero necessario assumere successive dosi.

Ricordarsi di bere bibite analcoliche (l'alcol disidrata, non idrata!!!), di fare di tanto in tanto delle pause all'aria fresca e riposarsi dalle danze

Se si sniffa non utilizzare banconote e/o pippotti in comune (rischio epatiti e altre malattie/infezioni)... meglio un pezzo di carta pulito!!! Usare un "pippotto per una riga" e sciacquare le narici prima e dopo di sniffare

Se è la prima volta che si prova una sostanza, prendere informazioni su di essa prima di assumerla

Fonti delle informazioni:

Wikipedia

