

VIAGRA/CIALIS

Appartengono alla classe dei medicinali denominati inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5. Aiutano a rilassare i vasi sanguigni nel pene, permettendo l'afflusso di sangue al pene. Il risultato è una migliore funzione erettile. Questi farmaci, abitualmente prescritti a uomini con più di 50 anni, sono spesso utilizzati dai più per sopperire alla disfunzione erettile causata dai trattamenti antiretrovirali (per HIV) o dagli antidepressivi, o nei comportamenti sessuali rischiosi in combinazione con "party drugs".

Info

Forma

Viagra®, Cialis® e Levitra® sono farmaci contro la disfunzione erettile. I principi attivi sono: **sildenafil** (Viagra®), **tadalafil** (Cialis®) e **vardenafil** (Levitra®).

Dosaggio

Viagra® max. 100 mg, Cialis® e Levitra max. 20 mg per os (capsule assunte per via orale).

Durata

Gli effetti iniziano dopo 25 minuti dall'assunzione e durano per circa 4-6 ore per il Viagra, fino a 36 ore per il Cialis.

Effetti:

Ricercati: questi farmaci favoriscono la funzionalità erettile favorendo l'afflusso di sangue nei corpi cavernosi del pene, miglioramento delle performance e della soddisfazione sessuale.

Indesiderati: dolore al torace, arrossamento facciale, mal di testa, tachicardia, nausea, ipotensione, problemi cardiaci, dolori muscolari, capogiri, palpitazioni, perdita di sangue dal naso e dalle urine. La probabilità e l'intensità degli effetti collaterali aumentano in funzione del dosaggio e della combinazione con altre sostanze psicoattive, alcol compreso.

Effetti a lungo termine: ipotensione arteriosa

Rischi:

- perdita della vista (neuropatia ottica),
 - ictus, attacchi di cuore,
- reazioni allergiche, intolleranze,
- priapismo (erezione lunga e dolorosa).

Mix da evitare:

Popper, mefedrone, ecstasy, GHB/GBL, ketamina, cocaina, metanfetamina, alcol, succo di pompelmo. La combinazione di farmaci contro l'impotenza e popper può provocare la morte! Evitare mix con medicinali nitrati, antifungini, antiretrovirali, anticonvulsivanti, antiipertensivi.

Safer use:

Questi medicinali dovrebbero essere assunti solo su prescrizione medica e con la supervisione di un sessuologo clinico.

- Non assumere più di una volta al giorno e in dosi maggiori di quelle prescritte; se si assume un sovradosaggio, consultare il medico.
- In caso di acquisto su internet o comunque fuori da prescrizione medica non fare affidamento sulla descrizione del contenuto sull'imballaggio poiché non dà nessuna garanzia sulla vera natura del prodotto all'interno.
- Questi farmaci non sono efficaci nelle disfunzioni erettili di natura endocrinologica.

L'abuso di Viagra, Levitra e Cialis può portare alla **dipendenza** ma anche a forme di **disregolazione del Sistema Neurovegetativo**. È bene sapere che questi farmaci non sono efficaci al 100%. Per funzionare hanno bisogno di un coinvolgimento emotivo e di un desiderio sessuale. Se la causa della disfunzione erettile non è organica ma psicologica, come la comunissima "ansia da prestazione", il farmaco non sarà sufficiente a risolvere il problema ma fungerà da effetto placebo (*rassicuratore*). La serenità e la sicurezza che il farmaco, nel caso di buona riuscita del rapporto, diffonderà nel paziente, darà avvio a meccanismi di abuso e dipendenza difficili, successivamente, da sradicare.

Fonti: danno.ch, Erowid.org.

Le sostanze sono frequentemente adulterate.

Quotidianamente vengono immesse sul mercato nero Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) che sono molecole create per aggirare lo status illegale delle sostanze tradizionali e mimarne gli effetti. Delle NPS, proprio perché nuove, spesso non si conoscono effetti, rischi e danni.

Testa la tua sostanza con un servizio di drug checking prima di usarla!

I rischi del consumo di sostanze psicoattive dipendono sempre della tua persona, dalle tue condizioni di salute attuali e dal tuo ambiente circostante.



Progetto Neutavel